Roussane (par erreur)

Vass8R12s096-100

Vass8R12s096-100

Vass8R12s096-100

Vass8R12s096-100

dented applantation

Rougane Pause

Roudsane

8 R 12 1-96, 100

Survey Blance

Guerral Blance

Guerral Blance





CLOS 8 RANG 12 Souche 96-100

MATIGNATION: ROLLSamme (faux)

LARGE: Année:

Veraison: 20.7

Maturité: 8.8.88

Mill: O Pour.: 1

GRAPPE: G - M - P - Dim.: 12

L - M - C

Vigueur: 5

FORT: Grig - 1/2 érig - couché

Année: 15

TG - G - M - P - Dim.:

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

GULEND: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

MISC - Sph. - cyl. - obov. - cyl. - fus.

diatadagimlaatadaatad

Auturbut alas alas

ANNEE 1988 NOM Roussana Il

EMPLACEMENT 8 R12 x 96- loo

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité		Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité	
1 2 3 4	3445	21.3	253 253 213	6 5 6	15			27-5	307	23.7	25,7	8.8
21,3 Pourriture: 1 Port: Duge Vigueur: 3 mayer 0											-1	

NOM ROUSSAMME (faux) B EMPLACEMENT 8 R.12 & 36-100

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité			fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 4	13.3 8.3 13.3	13.3 × 16.3 × 16.3 × 16.3 ×	4 3 7		1815 22.5 1815 1815				94.7	31,7	25.8
. Pou		e ; 60	3 .3 .89	Mill 5	0	Port :	mi	enge'	V	igueu	r : 3	

NOM Rousanne (fause) LEMPLACEMENT & R. 12 196.100

Souche yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 4 26.2 1.3' 1
2 4 26.2 5-3 12

Pourriture: 80% Mill.: O Port:

26.2

3

4

Vigueur :

Roussane (faure) el 8 R 12 3- 96-100_(1.97)

drutadmimlmimhuhuhul

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui O- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

(Calvo 85)

Roussane (faux) cl 8 R 12 s-96-100 (0.97)

dratadentedantudantud

Désignation : Emplacement :

Juntarilanda

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 · vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 couprneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLHUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Y

Désignation : Emplacement :

Lundonlanda

Roussane (faux) el 8 R 12 A - 96-100

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6)

: coloré (7) - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne [3] -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

FLEUR (I)

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° d'ordre : Désignation :

Luntindunta

Emplacement :

Roussane (fausse) 8 R 12 s- 96-100 (s.98)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - cans villosité pubescente 172 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux (51 - velouté 152 - aranéeux (53 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente (74 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 166 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 17 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Roustane N° d'ordre : 8 R 120-96-100 (15) Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44 x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible (5) - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (79) Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 17 x). De couleur blanc (7) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée (2) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104, A jus incolore (705) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. 3 section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre 10 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 narbacée 117 - spéciale 118. De soparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (21). A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident léguisépeu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (3).

A pean fine (39 - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pépiles - apyrène.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

-Calvo 87

drintanlantanlantanlantanl

Roussanne 8 R 12 196. 100 (0.2) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

luntantanta

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

daatanlaaimalaataal

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (1) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (1).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : Désignation : Roussane Emplacement: 8R128.96-100 Angle des nervures : 1 -(2) -(3) : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L : (10) - 11 L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire · 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - (41) Dents : forme : (2) - 43 - 44 Dents (angle) : (15) - (17) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Luntarilanta